

Nr. 5

**STOFMISBRUG OG
ANDRE FORSTYRRELSER
SUPPLEMENT**

Undersøgtes cpr-nr. og initialer

Dato for interview

Interviewer

ID-kode: _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALKOHOLMISBRUG	3
STOFMISBRUG	10
ANOREXIA NERVOSA	28
BULIMIA NERVOSA	30
TICS.....	32

ALKOHOLMISBRUG

1. Hyppighed

Hvor tit drikker du for tiden? I de fleste weekender? Fredag og lørdag? Også midt på ugen?

NB: Optegn det mest almindelige mønster for forbrug (f.eks. hvis undersøgte som regel drikker 1-2 gange om ugen, men lejlighedsvis oftere scores 2). Hvis forbrugsmønstret er meget svingende, vurderes et gennemsnitligt forbrug.

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: 1-2 gange om ugen.

3 3 3 Tærskelværdi: 3 eller flere gange om ugen.

Tidl.:
 F **B** **S**

2. Mængde

Hvor meget _____ drikker du som regel?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: 1-2 genstande.

3 3 3 Tærskelværdi: 3 eller flere genstande.

Tidl.:
 F **B** **S**

3. Drikker mere end planlagt

Afhængighedssymptom nr. 3

Siger du nogle gange til dig selv, at du kun vil drikke en enkelt eller to genstande på en aften, og så bliver du fuld alligevel? Hvor tit sker det? Sker det, at du drikker hele dagen eller går på druk i flere dage?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Drikker lejlighedsvis mere end planlagt.

3 3 3 Tærskelværdi: Drikker ofte mere end planlagt.

Tidl.:
 F **B** **S**

4. Negative konsekvenser - fysisk

Misbrugssymptom nr. 1

Har der i det sidste halve år været tidspunkter, hvor du blev syg af at drikke for meget? Hvor mange gange? Er du kommet til at gøre skade på dig selv, når du drak? Er du faldet og har forvredet en ankel eller kommet til skade på anden måde? Har du haft blackouts? Er du vågnet op næste morgen uden at vide, hvad du gjorde aftenen før? Har din læge bedt dig om ikke at drikke alkohol, men hvor du gjorde det alligevel?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved en enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____
 F B S

5. Negative konsekvenser – farlig adfærd

Misbrugssymptom nr. 2

Har du i det sidste halve år gjort noget farligt, mens du drak? Kørt bil i fuld tilstand? Har du gjort andre ting, mens du var fuld, som du normalt ikke gør, som f.eks. løbet over sporene, mens der kom tog? Har du taget andre chancer?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved 1 enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____
 F B S

6. Negative konsekvenser – psykisk

Afhængighedssymptom nr. 7

Skifter dit humør dramatisk, når du drikker? Bliver du meget nemt ophidset og vred? Går du fra at være glad til at være ked af det? Føler du dig deprimeret, ængstelig, bekymret eller bange, når du drikker? Tænker du på at tage dit eget liv eller forsøger at gøre det, når du drikker? Bliver disse følelser forstærket, når du drikker? Hvor mange gange er det sket?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved en enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____
 F B S

7. Negative konsekvenser – skole og arbejde

Misbrugssymptom nr. 1

Har du inden for det sidste halve år haft problemer i skolen på grund af dit drikkeri? Eksamener, som du dumpede, fordi du var for fuld eller for tit havde tømmermænd til at kunne forberede dig ordentligt? Hjemmeopgaver, som du ikke fik afleveret? Synes du, dit drikkeri virker ind på dine skoleresultater? Påvirket dine karakterer? Er der nogen, som har antydnet, at det forholder sig sådan? Er du kommet i andre vanskeligheder på skolen på grund af dit drikkeri? Hvordan?

For studerende/elever med arbejde: *Har dit drikkeri påvirket dit arbejde? Er der dage, hvor du ikke er mødt på arbejde, fordi du havde tømmermænd? Har du fået vrøvl på arbejdspladsen, fordi du mødte fuld op?*

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved en enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____ _____ _____
 F **B** **S**

8. Negative konsekvenser - sociale

Misbrugssymptom nr. 4

Har du haft et alvorligt skænderi eller et slagsmål med en ven eller et familiemedlem, når du var fuld eller på grund af dit drikkeri? Har du mistet venner på grund af dit drikkeri eller fået problemer i dit forhold til familiemedlemmer eller en kæreste af den grund? Har du haft problemer med at komme ud af det med andre? Har dit drikkeri ført til, at disse problemer er blevet værre?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved en enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____ _____ _____
 F **B** **S**

9. Negative konsekvenser – retslige

Misbrugssymptom nr. 3

Har du i det sidste halve år gjort noget ulovligt, mens du var fuld? Stjålet en bil? Kørt fornøjelsestur i en fremmeds bil? Blevet standset for at køre i påvirket tilstand? Andre ting? Gjort andre ting, for eksempel solgt stoffer, stjålet noget, begået hærværk?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved en enkelt lejlighed.

3 3 3 Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

Tidl.: _____ _____ _____
 F **B** **S**

10. Påvirket ved udførelse af vigtig opgave

Misbrugssymptom nr. 1

Har der det sidste halve år været tidspunkter, hvor du drak dig fuld, da du gik i skole? Drak dig fuld, mens du skulle passe et barn? Gået fuld på arbejde eller drukket dig fuld på arbejde? Hvor tit er det sket?

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
1 1 1 Ikke til stede.
2 2 2 Subtærskelværdi: 1-2 gange.
3 3 3 Tærskelværdi: 3 eller flere gange.

Tidl.: _____
F B S

11. Vigtige arbejdsmæssige eller sociale aktiviteter eller fritidsaktiviteter opgivet eller begrænset på grund af misbrug.

Afhængighedssymptom nr. 6

Hvor mange gange inden for det sidste halve år har du droppet skolen eller arbejdet for at drikke i stedet? Eller er blevet væk fordi du havde tømmermænd? Har du på det sidste drukket i stedet for at bruge din tid på de fritidsaktiviteter, som du førhen holdt af, f.eks. sport eller andre ting? Har den tid, hvor du drikker, taget tid fra din familie eller venner?

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
1 1 1 Ikke til stede.
2 2 2 Subtærskelværdi: Udeladt vigtig aktivitet én gang.
3 3 3 Tærskelværdi: Udeladt vigtig aktivitet mere end én gang.

Tidl.: _____
F B S

12. Tidsforbrug

Afhængighedssymptom nr. 5

*Hvor meget tid bruger du på at drikke, være fuld eller have tømmermænd? Bruger du lang tid på at tænke på at blive fuld, og hvor du skal gå hen for at få noget at drikke?
Hvor meget tid bruger du på at komme dig, efter du har drukket?*

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
1 1 1 Ikke til stede.
2 2 2 Subtærskelværdi: Tid anvendt på drukrelaterede aktiviteter er begrænset. F.eks. kun "hobbydrikkeri", eksempelvis i festsammenhænge.
3 3 3 Tærskelværdi: Den anvendte tid omfatter mere end svarende til "hobbydrikkeri" og hæmmer andre aktiviteter til en vis grad.

Tidl.: _____
F B S

13. Tolerance

Afhængighedssymptom nr. 1

Hvor gammel var du, da du begyndte at drikke regelmæssigt? Hvor meget drak du som regel der? Hvor meget drikker du som regel nu? Hvor gammel var du, da du begyndte at drikke så meget?

Synes du, at du bliver nødt til at drikke meget mere nu for at blive lige så fuld, som du blev første gang? Hvor meget skal du drikke nu for at komme dertil?

Kan du drikke mere end de fleste andre uden at blive specielt fuld? Hvor meget mere? Har alkoholen mindre effekt på dig nu end før?

NB: Da en vis grad af tolerance er en normal fysiologisk proces ved begyndelsen af et forbrug, skal tolerancesymptomet kun vurderes som opfyldt, eftersom mængden af alkohol, som skal til for at opnå rus, øges efter en periode med regelmæssig brug.

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Behov for at drikke 1-2 genstande mere end i begyndelsen for at blive fuld eller opnå den ønskede virkning.

3 3 3 Tærskelværdi: Behov for at drikke 3 eller flere genstande for at blive fuld eller opnå den ønskede virkning.

Tidl.:
 F B S

14. Prøver at holde op

Afhængighedssymptom nr. 4

Har du nogensinde prøvet at holde op med at drikke eller skære ned på det? Hvor mange gange har du prøvet at skære ned?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Subtærskelværdi: Forbigående tanker om ønsket om at skære ned eller kontrollere forbrug.

3 3 3 Tærskelværdi: Ét eller flere forsøg uden succes på at skære ned eller kontrollere forbrug.

Tidl.:
 F B S

15. Abstinenser/afvænnings symptomer

Afhængighedssymptom nr. 2

Har du nogensinde haft mandolinfeber, når du skar ned eller holdt op med at drikke? Haft rigtig slem hovedpine? Følt dig meget angst, nedtrykt eller irriteret? Haft større problemer med at sove? Kvalme? Forbigående hallucinationer eller illusioner?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Tærskelværdi: Et eller flere afvænnings symptomer bekræftes.

Tidligere:
 F B S

NB: Medregn ikke simple tømmermænd.

16. Indtager alkohol for at lindre abstinenser/afvænningsproblemer

Afhængighedssymptom nr. 2

Drikker du sommetider for at undgå at blive syg eller få mandolinfeber.

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Tærskelværdi: Én eller flere gange.

Tidligere:
 F **B** **S**

17. Varighed

Hvor længe havde du (symptomer på alkoholmisbrug/-afhængighed)?

F B S

0 0 0 Ingen information.

1 1 1 Ikke til stede.

2 2 2 Tærskelværdi: Nogle symptomer i mindst 1 måned.

Tidligere:
 F **B** **S**

Koder

0 = Ingen information

1 = Nej

2 = Ja

18. Alkoholmisbrug

DSM-IV-kriterier

Et maladaptivt mønster af alkoholforbrug, som fører til klinisk betydningsfuldt ubehag eller funktionssvækkelse, og som viser sig ved 1 eller flere af følgende i en 12-måneders-periode:

- 1) Fortsat forbrug trods tilbagevendende arbejdsmæssige, skolemæssige eller sociale konsekvenser forårsaget eller forværret af alkoholforbrug.
- 2) Tilbagevendende retsligt relaterede problemer.
- 3) Tilbagevendende forbrug ved forventet opfyldelse af væsentlige rolleforpligtelser.
- 4) Tilbagevendende forbrug i fysisk farlige situationer (f.eks. spirituskørsel).

Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2

19. Alkoholafhængighed

DSM-IV-kriterier

Et maladaptivt mønster af alkoholforbrug, som fører til klinisk betydningsfuldt ubehag eller funktionssvækkelse, og som viser sig ved 3 eller flere af følgende kriterier, som er forekommet på et tidspunkt i løbet af samme 12-månedersperiode:

- 1) Drikker mere end planlagt.
- 2) Fortsat forbrug trods tilbagevendende fysiske, psykiske og sociale problemer forårsaget eller forværret af alkoholforbrug.
- 3) Vigtige sociale, arbejdsmæssige aktiviteter eller fritidsaktiviteter opgivet eller reduceret på grund af misbrug.
- 4) Tidsrøvende.
- 5) Tolerance (50 % øgning af alkoholmængde krævet til opnåelse af forgiftning eller ønsket virkning samt klar nedsat virkning ved fortsat brug af samme mængde).
- 6) Forgæves indsats(er) for at skære ned eller kontrollere alkoholforbrug; eller
- 7) Har haft abstinenssymptomer eller drikker for at lindre abstinenssymptomer.

Samlet AE	Samlet ST
--------------	--------------

0 1 2	0 1 2
-------	-------

NB: Alkoholmisbrug eller –afhængighed kan være forbundet med ét eller flere af følgende mønstre for drikkeri: 1) Regelmæssig daglig indtagelse af store mængder alkohol; 2) Regelmæssigt kraftigt drikkeri begrænset til weekender; eller 3) Lange perioder af ædruelighed afbrudt af orgier af dagligt drikkeri af en varighed på flere uger eller mere.

STOFMISBRUG

1. Hyppighed

Hvor tit bruger du sædvanligvis _____? De fleste weekender? Midt på ugen?

Brug slangudtryk brugt af undersøgte til at beskrive narkotika.

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: 1-2 gange om ugen

3 = Tærskelværdi: 3 til flere gange om ugen

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

2. Bruger mere end planlagt

Afhængighedssymptom nr. 3

Siger du nogensinde til dig selv, at du kun vil (f.eks. ryge en joint, tage én stribe osv.) på en given dag eller nat for så at opdage, at du bruger meget mere, end du planlagde? Hvor tit sker det?

Hvad med at bruge ____ hele dagen eller tage stoffer over flere dage?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Bruger lejlighedsvis mere end planlagt

3 = Tærskelværdi: Bruger ofte (3 eller flere gange) mere end planlagt

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

3. Negative konsekvenser – fysiske

Afhængighedssymptom nr. 7

Har der inden for det sidste halve år været et tidspunkt, hvor du blev syg af at bruge for meget _____? Hvor mange gange? Er du ved et uheld kommet til skade, når du var påvirket? Faldet og forvredet en ankel eller skadet dig selv på anden måde? Besvimet? Vågnet op næste dag uden at kunne huske, hvad du gjorde dagen før?

Har din læge bedt dig om ikke at bruge _____, men hvor du gjorde det alligevel?

Koder

- 0 = Ingen information
1 = Ikke til stede
2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed
3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

4. Negative konsekvenser – farlig adfærd

Misbrugssymptom nr. 2

Har du inden for det sidste halve år gjort noget farligt, mens du var påvirket? Kørt bil? Kørt stærkt på motorvejen? Har du gjort andre ting, som du ikke normalt ville gøre, som at løbe tværs over et spor når der kom et tog? Har du taget andre risikofyldte chancer?

Koder

- 0 = Ingen information
1 = Ikke til stede
2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed
3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

5. Negative konsekvenser – psykiske

Afhængighedssymptom nr. 7

Ændrer dit humør sig dramatisk, når du bruger _____? Opdager du, at du lettere bliver ophidset? Skifter du fra at være meget glad til meget trist? Kan du finde på at græde over småting?

Føler du dig deprimeret, angstelig, bekymret eller bange, når du bruger _____? Tænker du på at tage dit eget liv eller forsøger at gøre det, når du bruger _____? Bliver disse humørtilstande værre, når du bruger _____? Hvor mange gange er det sket?

Koder

- 0 = Ingen information
- 1 = Ikke til stede
- 2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed
- 3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

6. Negative konsekvenser – skole og arbejde

Misbrugssymptom nr. 1

Har du inden for det sidste halve år haft problemer i skolen på grund af _____?
Eksamener, som du fik ødelagt, fordi du var for påvirket eller havde eftervirkninger, så du ikke kunne læse ordentligt til eksamen?
Hjemmeopgaver, som du ikke fik afleveret? Mener du, at dit brug af _____ har påvirket dit skolearbejde? Påvirket dine karakterer? Er du kommet i andre vanskeligheder på skolen på grund af _____? Hvordan? Er der andre, der har antydnet, at det kunne forholde sig sådan?

For studerende/elever der arbejder: Har dit brug af _____ haft indflydelse på dit arbejde? Er der dage, hvor du ikke er mødt op arbejde, fordi du havde eftervirkninger? Har du fået ballade på arbejdspladsen, fordi du var påvirket?

Koder

- 0 = Ingen information
1 = Ikke til stede
2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed.
3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

7. Negative konsekvenser - socialt

Misbrugssymptomer nr. 4

Har du haft problemer med en kæreste, fordi du tager stoffer? Hvor mange gange?

Har du haft et alvorligt skænderi eller slagsmål med en ven eller et familiemedlem, når du var høj, eller fordi du tog stoffer? Har du mistet en ven eller kæreste på grund af stoffer eller fået problemer i dit forhold til familiemedlemmer af den grund? Har du haft problemer med at komme godt ud af det med andre? Har dit brug af _____ ført til, at disse problemer er blevet værre?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed.

3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder.

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

8. Negative konsekvenser - retslige

Misbrugssymptom nr. 3

Har du inden for det sidste halve år gjort noget ulovligt, når du var påvirket? Stjålet en bil? Kørt for sjov i en stjålet bil? Blevet standset for at køre i påvirket tilstand? Andre ting?

Gjort andre ting, for eksempel solgt stoffer, stjålet noget, begået hærværk?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed

3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

9. Påvirket ved forventet opfyldelse af væsentlige rolleforpligtelser

Misbrugssymptom nr. 1

Har der i det sidste halve år været tidspunkter, hvor du blev påvirket i skolen eller var påvirket, inden du gik i skole? Blev du påvirket, mens du skulle passe et barn? Er du gået på arbejde påvirket eller taget ____ på arbejde? Hvor tit er det sket?

Koder

- 0 = Ingen information
- 1 = Ikke til stede
- 2 = Subtærskelværdi: Kun negative konsekvenser ved én enkelt lejlighed
- 3 = Tærskelværdi: Negative konsekvenser ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

10. Vigtige arbejdsmæssige, sociale eller fritidsaktiviteter opgivet eller reduceret på grund af stofmisbrug

Afhængighedssymptom nr. 6

Hvor mange gange i det sidste halve år er du udeblevet fra skolen eller dit arbejde for at tage stoffer og blive påvirket? Eller ikke mødt, fordi du havde eftervirkninger? Vil du mene, at du på det sidste har taget _____ i stedet for at bruge tiden på de fritidsinteresser, som du plejede at holde af f.eks. sport eller andre ting? Har den tid, du bruger på stoffer, overtaget den tid, du plejede at bruge sammen med din familie eller venner?

Koder

- 0 = Ingen information
- 1 = Ikke til stede
- 2 = Subtærskelværdi: Vigtig aktivitet mistet ved kun én enkelt lejlighed
- 3 = Tærskelværdi: Vigtig aktivitet mistet ved 2 eller flere lejligheder

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

11. Tidsforbrug

Afhængighedssymptom nr. 5

Hvor meget af din tid bruger du på _____, på at være høj eller på at komme ned igen bagefter?
Bruger du meget tid på at planlægge, hvordan du skal skaffe _____?

Hvor lang tid bruger du på at komme dig, efter du har brugt _____?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Tid brugt på stoffer eller tanker om stoffet har minimal indvirkning på hverdagen. Forbrug er primært begrænset til weekender

3 = Tærskelværdi: Tid brugt på stoffer eller tanker om stoffet har moderat til svær indvirkning på hverdagen. Også et vist forbrug midt på ugen

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

12. Tolerance

Afhængighedssymptom nr. 1

Hvor gammel var du, da du begyndte at bruge _____ regelmæssigt? Hvor meget brugte du som regel/normalt der?

Hvor meget _____ bruger du som regel/normalt nu? Hvor gammel var du, da du begyndte at bruge så meget?

Har du opdaget, at du bliver nødt til at bruge meget mere nu for at blive lige så påvirket, som du blev, da du startede på det?

Kan du bruge mere end de fleste andre uden at blive specielt høj? Hvor meget mere? Har _____ mindre effekt på dig nu end før?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Er nødt til at bruge noget mere af stoffet for at opnå beruselse eller ønsket effekt

3 = Tærskelværdi: Er nødt til at bruge mindst 1,5 gang så meget af stoffet for at opnå beruselse eller ønsket effekt

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

13. Prøver at holde op

Afhængighedssymptom nr. 4

Har du nogensinde før prøvet at holde op eller skære ned på forbruget? Hvad skete der?

Koder

0 = Ingen information

1 = Ikke til stede

2 = Subtærskelværdi: Forbigående tanker/ønsker om at reducere eller kontrollere forbruget

3 = Tærskelværdi: Ét eller flere forgæves forsøg på at reducere eller kontrollere forbruget

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. Stimulerende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. Kokain	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. Opiater	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. Hallucinogener	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. Ecstasy	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. Anabole steroider	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. Andet	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. Blandingsmisbrug	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

14. Abstinenssymptomer

Afhængighedssymptom nr. 2

Har du nogensinde før haft ubehagelige reaktioner, når du prøvede at holde op eller skære ned?

Kriterier: Rysteture, paranoia, hallucinationer, søvnløshed, depression, angst osv. Ét eller flere symptomer.

Koder

0 = Ingen information

1 = Nej

2 = Ja

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. Stimulerende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. Kokain	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. Opiater	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. Hallucinogener	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. Ecstasy	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. Anabole steroider	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. Andet	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. Blandingsmisbrug	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

15. Taget stoffer for at lindre abstinenserne

Afhængighedssymptom nr. 2

Hvis oplevelse af abstinenssymptomer er nævnt:

Hvad gjorde du for at få _____ til at gå over?
Tog du _____?

Sker det, at du nogle gange tager stoffer for at hindre, at du bliver syg eller _____ (f.eks. rysteture)?

Kriterier: Ved én eller flere lejligheder.

Koder

0 = Ingen information

1 = Nej

2 = Ja

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. Stimulerende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. Kokain	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. Opiater	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. Hallucinogener	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. Ecstasy	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. Anabole steroider	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. Andet	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. Blandingsmisbrug	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

16. Varighed

Hvor længe varer _____ (symptomer på stofmisbrug/ -afhængighed)?

Kriterier: Nogle symptomer i mindst 1 måned.

Koder

0 = Ingen information

1 = Nej

2 = Ja

	Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. Stimulerende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. Kokain	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. Opiater	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. Hallucinogener	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. Ecstasy	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. Anabole steroider	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. Andet	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. Blandingsmisbrug	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

17. Stofmisbrug

DSM-IV-kriterier

- A. Et maladaptivt mønster af stofforbrug, som fører til klinisk betydningsfuldt ubehag eller funktionsvækkelse, og som viser sig ved 1 eller flere af følgende i en 12-månedersperiode:
- 1) Fortsat forbrug trods tilbagevendende arbejdsmæssige, skolemæssige eller sociale konsekvenser forårsaget eller forværret af stofforbrug.
 - 2) Tilbagevendende retslige relaterede problemer.
 - 3) Tilbagevendende forbrug ved forventet opfyldelse af væsentlige rolleforpligtelser.
 - 4) Tilbagevendende forbrug i fysisk farlige situationer (f.eks. spirituskørsel).
- B. Symptomerne har aldrig opfyldt kriterierne for stofafhængighed.

	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2	0 1 2
b. Stimulerende midler	0 1 2	0 1 2
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2	0 1 2
d. Kokain	0 1 2	0 1 2
e. Opiater	0 1 2	0 1 2
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2	0 1 2
g. Hallucinogener	0 1 2	0 1 2
h. Ecstasy	0 1 2	0 1 2
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2	0 1 2
j. Anabole steroider	0 1 2	0 1 2
k. Andet	0 1 2	0 1 2
l. Blandingsmisbrug	0 1 2	0 1 2

18. Stofafhængighed

DSM-IV-kriterier

Et maladaptivt mønster af stofforbrug, som fører til klinisk betydningsfuldt ubehag eller funktions-svækkelse, og som viser sig ved 3 eller flere af følgende kriterier, som er forekommet på et tidspunkt i løbet af samme 12-måneders-periode:

- 1) Bruger mere end planlagt.
- 2) Fortsat forbrug trods tilbagevendende fysiske, psykiske og sociale problemer forårsaget af eller forværret ved forbrug.
- 3) Vigtige sociale, arbejdsmæssige aktiviteter eller fritidsaktiviteter opgivet eller reduceret på grund af misbrug.
- 4) Tidsrøvende.
- 5) Tolerance (50 % øgning af stofmængde krævet til opnåelse af forgiftning eller ønsket virkning samt klar nedsat virkning ved fortsat brug af samme mængde).
- 6) Forgæves indsats(er) for at skære ned eller kontrollere stofforbrug; eller
- 7) Har haft abstinenssymptomer eller klar nedsat virkning ved fortsat forbrug af samme mængde stof.

a. Cannabis

b. Stimulerende midler

c. Beroligende/søvnfremkaldende midler

d. Kokain

e. Opiater

f. PCP (fencyklidin)

g. Hallucinogener

h. Ecstasy

i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler

j. Anabole steroider

k. Andet

l. Blandingsmisbrug

	Samlet AE	Samlet ST
a. Cannabis	0 1 2	0 1 2
b. Stimulerende midler	0 1 2	0 1 2
c. Beroligende/søvnfremkaldende midler	0 1 2	0 1 2
d. Kokain	0 1 2	0 1 2
e. Opiater	0 1 2	0 1 2
f. PCP (fencyklidin)	0 1 2	0 1 2
g. Hallucinogener	0 1 2	0 1 2
h. Ecstasy	0 1 2	0 1 2
i. Opløsningsmidler/inhalationsmidler	0 1 2	0 1 2
j. Anabole steroider	0 1 2	0 1 2
k. Andet	0 1 2	0 1 2
l. Blandingsmisbrug	0 1 2	0 1 2

NB: Stofmisbrug eller -afhængighed kan være forbundet med ethvert af de følgende mønstre af forbrug: 1) Regelmæssig daglig indtagelse af store mængder stof; 2) Regelmæssigt kraftig brug af stoffer begrænset til weekender; eller 3) Lange stoffri perioder afbrudt af omgange med dagligt stofforbrug af en varighed på flere uger eller mere.

ANOREXIA NERVOSA

Da vi talte sammen før, snakkede du om, hvor bange du var for at blive tyk, også selv om du for tiden er meget tynd.

1. Forstyrret kropsofattelse

Føler du dig tyk, selv når alle fortæller dig, at du ikke ser sådan ud? Vil du gerne blive tyndere? Er der dele af din krop, som føles særligt tykke? Generer det dig, at du har tabt dig så meget og stadig føler dig tyk? Mener du, at du faktisk har tabt dig, eller at det bare er andre, der fejlagtigt synes det? Hvordan tager de fejl?

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
- 1 1 1 Ikke til stede.
- 2 2 2 Subtærskelværdi: Beretter om at føle sig tyk og er ofte plaget af disse tanker, skønt klar over ikke at være tyk efter objektiv standard.
- 3 3 3 Tærskelværdi: Opfattelsen af sig selv som tyk er uændret trods objektive beviser på det modsatte.

Tidl.: _____
 F B S

2. Amenoré/udeblivelse af menstruation

Hvor gammel var du, da du begyndte at få menstruationer? Hvor tit får du menstruationer? Hvor mange uger er der gået siden din sidste menstruation.

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
- 1 1 1 Ikke til stede.
- 2 2 2 Subtærskelværdi: Milde menstruationsforstyrrelser (f.eks. lejlighedsvis forlænget eller forkortet menstruationscyklus).
- 3 3 3 Tærskelværdi: 3 eller flere på hinanden følgende menstruationer er udeblevet.

Tidl.: _____
 F B S

3. Tegn på anorexia nervosa

DSM-IV-kriterier

Koder

0 = Ingen information

1 = Nej

2 = Ja

Opfylder følgende kriterier:

- 1) Nægter at opretholde kropsvægt på eller over minimum af normalvægt i forhold til alder og højde. Afmagret og vægttab, der fører til vedligeholdelse af vægt 15 % under forventet vægt.
- 2) Intens angst for at tage på eller blive tyk, trods undervægtig.
- 3) Forstyrret kropsopfattelse. Urimelig påvirkning af kropsvægt og kropsform ved selvvurdering eller benægter alvoren i den nuværende lave kropsvægt; samt
- 4) Hos kvinder udeblivelse af 3 på hinanden følgende menstruationer.

**Samlet
AE**

**Samlet
ST**

0 1 2

0 1 2

4. Restriktiv type

Personen har ikke regelmæssigt kastet sig ud i ædeflip eller udrensende adfærd i løbet af episoden (dvs. selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller lavementer).

0 1 2

0 1 2

5. Bulimisk type

Personen har regelmæssigt i løbet af episoden kastet sig ud i spiseorgier eller udrensende adfærd (f.eks. selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller lavementer).

0 1 2

0 1 2

BULIMIA NERVOSA

Da vi talte sammen før, sagde du, at du har haft ædeflip. Når du har de ædeflip...

1. Mangel på kontrol

Føler du så, at du ikke har nogen kontrol over dine ædeflip? Kan du holde op med at spise, når du først er begyndt?

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
- 1 1 1 Ikke til stede.
- 2 2 2 Subtærskelværdi: Kan ofte kontrollere trangen til at proppe sig (f.eks. mindst 50 % af tiden).
- 3 3 3 Tærskelværdi: Kan til tider kontrollere trangen til at proppe sig, men normalt ikke.

Tidl.: _____
 F B S

2. Overdreven optagethed af vægt

Hvor tit tænker du på din vægt eller på at blive tyk? Kommer du til at tænke på din vægt, når du er i skole, ude med dine venner eller har travlt med et eller andet?

F B S

- 0 0 0 Ingen information.
- 1 1 1 Ikke til stede.
- 2 2 2 Subtærskelværdi: Overdreven optagethed af vægt; den værdi, der tillægges tyndhed, overskrider kulturelle normer, men bryder ikke ind i funktionsevnen.
- 3 3 3 Tærskelværdi: Stadige tanker om vægt med moderat eller svær indvirkning på hverdagsaktiviteter (f.eks. koncentration svækket af tanker om vægt).

Tidl.: _____
 F B S

Koder for resterende emner

- 0 = Ingen information
1 = Nej
2 = Ja

3. Varighed

Hvor længe har du haft ædeflip?

Kriterier: 3 måneder eller mere.

Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

4. <u>Tegn på bulimia nervosa</u>	Samlet AE	Samlet ST
DSM-IV-kriterier		
Opfylder følgende kriterier:	0 1 2	0 1 2
1) Har gentagne episoder med ædeflip, som er kendetegnet ved: a) Stort indtag af mad over et begrænset tidsrum (f.eks. i løbet af 2 timer), som er klart større end det, de fleste ville spise i løbet af tilsvarende tid under lignende omstændigheder. b) En følelse af ikke at have kontrol over spisning under episoden (f.eks. en følelse af ikke at kunne holde op med at spise eller kontrollere, hvor meget man spiser).		
2) Gentagen uhensigtsmæssig kompensatorisk adfærd, som skal hindre vægtøgning. F.eks. selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller lavementer, faste eller overdreven fysisk aktivitet.		
3) Både ædeflip og den uhensigtsmæssige kompensatoriske adfærd forekommer i gennemsnit mindst 2 gange om ugen over 3 måneder; samt		
4) Lidelsen optræder ikke kun under episoder med anorexia nervosa.		
 5. <u>Specifér form</u>		
Med selvfremkaldt tømning Under den nuværende episode af bulimia nervosa har personen regelmæssigt foretaget selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller lavementer.	0 1 2	0 1 2
Uden selvfremkaldt tømning Under den nuværende episode af bulimia nervosa har personen foretaget anden upassende kompensatorisk adfærd, såsom faste eller overdreven fysisk aktivitet, men ikke selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller lavementer.	0 1 2	0 1 2

TICS

For at symptomerne kan scores positivt i dette afsnit, skal de optræde mange gange om dagen næsten hver dag eller have optrådt med mellemrum i 1 år eller mere.

Koder

0 = Ingen information
1 = Nej
2 = Ja

SIMPLE MOTORISKE TICS

Bedøm på grundlag af rapportering og observationer.

1. Blinken med øjne

Blinker dine øjne meget tit – sådan her – uden nogen særlig grund (demonstrér)?

Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

2. Andre ansigtstics

Bevæger andre dele af dit ansigt sig sommetider uventet – sådan her – (demonstrér ansigtsgrimasser, knagende næselyde og munden åbnet som et gab)?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Hovedryk

Nikker du sommetider med hovedet, ryster på hovedet eller vender dit hoved til siden uden nogen særlig grund (demonstrér)?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

4. Skulderryk

Hvad med dine skuldre, bevæger de sig sommetider helt uventet, ligesom jeg gør nu (træk på skuldrene eller rul med skuldrene)?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

6. Mavetics

Bevæger din mave sig sommetider uden nogen særlig grund?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

7. Bevægelse i benene

Tramper du sommetider med fødderne eller sparker med benene uden at være sikker på, hvorfor du gør det? Sparker du sommetider op under bordet uden at ville det?

0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

8. Andet

Er der andre bevægelser, du har lagt mærke til, som jeg ikke har spurgt dig om?

Specificér: _____

9. Opsummering af alle simple motoriske tics

Enkelte motoriske tics, som forekommer mange gange i løbet af dagen eller periodevis igennem mere end et år.

KOMPLEKSE MOTORISKE TICS

1. Røre ved/prikke på ting

Rører du nogensinde ved din egen krop, din næse, dine ører eller føler, at du er nødt til at røre ved andre, som f.eks. at du føler, at du skal røre ved telefonen, hver gang du går forbi den, røre ved vægge eller alle møblerne i dit værelse? Banker du tit i bordet med blyanten eller med dine fingre?

2. Hoppe/snurre

Når du går ned ad gangen på skolen, opdager du så sommetider, at du er nødt til at hoppe eller snurre rundt i stedet for at gå lige ud?

3. Ekkokinese

Synes du sommetider, at du skal efterligne andres handlinger, som f.eks. stryge dit hår tilbage eller pille dig på næsen? Er der andre?

4. Skader sig selv

Føler du nogensinde, at du bliver nødt til at slå dig selv i ansigtet, trække i dit hår eller bide dig selv i hånden?

Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

5. Andet

Er der andre bevægelser, du har lagt mærke til, som jeg ikke har spurgt dig om?

Specificér: _____

6. Opsummering af alle komplekse motoriske tics

Komplekse motoriske tics, som forekommer mange gange i løbet af dagen eller periodevis igennem mere end et år.

SIMPLE VOKALE TICS

1. Snøfte/hoste/rømme sig

Snøfter du nogensinde, hoster eller rømmer dig, når du ikke er forkølet? Sker det igen og igen?

2. Puste/grynte

Laver du nogensinde lyde gennem næsen eller i halsen – sådan her (demonstrér)?

3. Andet

Er der andre lyde, du har lagt mærke til, som jeg ikke har spurgt dig om? Hvad med klik med tungen, smækken med læberne?

Specificér: _____

4. Opsummering af alle simple vokale tics

Simple vokale tics, som forekommer mange gange i løbet af dagen eller periodevis igennem mere end et år.

Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

KOMPLEKSE VOKALE TICS

1. Gentager egne ord/sætninger

Lægger du nogensinde mærke til, at du er nødt til at gentage dig selv? Ikke fordi man ikke har hørt, hvad du sagde, men fordi det ikke lød rigtigt eller måske uden nogen grund overhovedet?

2. Gentager andres tale

Opdager du sommetider, at du gentager ting, som andre har sagt, uden der er nogen grund til det?

3. Koproli (obskøne ord)

Kommer der sommetider uden grund uartige eller frække ord ud af munden på dig midt i en sætning, eller opdager du, at du siger frække ord lavt for dig selv, og at du ikke kan lade være?

4. Fornærmelser/racediskriminerende udtryk

Opdager du sommetider, at du siger grimme ting til folk om, hvordan de ser ud, eller noget andet ved dem, selv om du ikke rigtig mener det?

5. Andet

Er der andre ting, som du sommetider opdager, at du siger? Er du bange for, at du kan få sådan et anfald?

Specificér: _____

6. Opsummering af alle komplekse vokale tics

Komplekse vokale tics som forekommer mange gange i løbet af dagen eller periodevis igennem mere end et år.

7. Funktionssvækkelse

a. Socialt (med kammerater):

b. Med familien:

c. I skolen:

Forældre AE	Forældre ST	Barn AE	Barn ST	Samlet AE	Samlet ST
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

8. Tegn på Tourettes syndrom

DSM-IV-kriterier

Opfylder følgende kriterier:

- 1) Både multiple motoriske og én eller flere vokale tics har været til stede på et tidspunkt i løbet af sygdommen, skønt ikke nødvendigvis sideløbende.
- 2) Disse tics optræder mange gange om dagen (som regel i anfald) næsten dagligt eller intermitterende i 1 år eller mere.
- 3) Debut før det fyldte 18. år, og de ticsfrie perioder er aldrig længere end 3 måneder ad gangen.
- 4) Ikke grundet i psykofarmakologiske eller organiske årsager (f.eks. Huntingtons chorea); samt
- 5) Forstyrrelser forårsager markante psykiske kvaler eller markant funktionssvækkelse.

**Samlet
AE**

0 1 2

**Samlet
ST**

0 1 2

9. Kroniske motoriske eller vokale tics

DSM-IV-kriterier

Opfylder følgende kriterier:

- 1) Enten motoriske eller vokale tics, men ikke begge, har været til stede i løbet af sygdommen.
- 2) Disse tics optræder mange gange om dagen, næsten hver dag eller intermitterende i 1 år eller mere.
- 3) Debut før det fyldte 18. år, og de ticsfrie perioder er aldrig længere end 3 måneder ad gangen.
- 4) Ikke grundet i psykofarmakologiske eller organiske årsager (f.eks. Huntingtons chorea); samt
- 5) Symptomerne forårsager markante psykiske kvaler eller markant funktionssvækkelse.

0 1 2

0 1 2

10. Forbigående tics

DSM-IV-kriterier

Opfylder følgende kriterier:

- 1) Enkle eller motoriske og/eller vokale tics, men ikke begge, har været til stede i løbet af sygdommen.
- 2) Disse tics optræder mange gange om dagen næsten dagligt i mindst 4 uger, men ikke længere end 12 på hinanden følgende måneder.
- 3) Debut før det fyldte 18. år.
- 4) Aldrig opfyldt kriterier for Tourettes syndrom eller kroniske motoriske eller vokale tics.
- 5) Lidelsen er ikke grundet i psykofarmakologiske eller somatiske (f.eks. Huntingtons chorea) årsager; og
- 6) Symptomer forårsager markante psykiske kvaler eller markant funktionssvækkelse.

Specificér og beskriv enkelte episoder eller tilbagevendende tics:

11. Tics – uspecificeret

DSM-IV-kriterier

Denne kategori er for forstyrrelser, der er kendetegnet ved tics, som ikke opfylder kriterierne for en specifik tic-forstyrrelse. Eksempelvis tics, som varer i mindre end 4 uger, eller tics, som debuterer efter 18-års-alderen.

**Samlet
AE**

0 1 2

**Samlet
ST**

0 1 2

0 1 2

0 1 2